
Flapoorcorrectie (KNO)

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's
Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Wat zijn flaporen?



Flaporen zijn oren die meer dan gemiddeld afstaan. Dit komt meestal door een afwijking in het kraakbeen van de oorschelp. Flaporen kunnen geen kwaad, maar sommige mensen of kinderen vinden ze storend. Daarom kiezen ze voor een operatie. Een flapoorcorrectie kan vanaf ongeveer 6 jaar. Op deze leeftijd zijn kinderen zich vaak bewust van hun uiterlijk. Ook komen op deze leeftijd soms vervelende opmerkingen voor. Ook op latere leeftijd kunt u nog een flapoorcorrectie laten doen.

Operatie

Voorbereiding op de operatie

Gebruikt u medicijnen die het bloed verdunnen, zoals aspirine of acenocoumarol? Geef dit dan door aan de KNO-arts. U hoort van ons wanneer u hiermee moet stoppen.

Rookt u? Stop dan minstens 3 weken voor de operatie. Roken vertraagt de genezing van wonden. Probeer ook 1 week na de operatie niet te roken.

Tijdens de operatie

De operatie duurt ongeveer 1 uur. Meestal komt u 's ochtends en mag u aan het eind van de dag weer naar huis (dagbehandeling). Bij kinderen gebeurt de operatie onder narcose. Volwassenen krijgen meestal plaatselijke verdoving.

Tijdens de operatie:

- Maakt de arts een snee aan de achterkant van het oor.
- Vouwt het kraakbeen om en maakt het eventueel wat soepeler met kleine sneetjes.
- Zet het kraakbeen vast met speciale hechtingen.
- Verwijdert een stukje huid aan de achterkant van het oor.
- Sluit de wond.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u een stevig verband om het hoofd, ook wel een 'tulband' genoemd. Dit verband blijft een week zitten. U kunt in die week uw haar niet wassen. Na een week komt u terug op de polikliniek. De KNO-arts verwijdert dan het verband en de hechtingen.

Daarna:

- Draagt u of uw kind 's nachts een haarband (zoals een tenniszweetband) voor 4 tot 6 weken.
- Moet u overdag voorzichtig zijn met de oren.
- Raden we contactsporten de eerste 4 tot 6 weken af.

De oren kunnen in de eerste weken wat rood, gezwollen of gevoelig zijn. Dit is normaal en trekt vanzelf weg.

Pijnstilling

Na de operatie kunt u pijn hebben. Gebruik dan paracetamol. Neem geen pijnstillers zoals aspirine, ascal of kinderaspirine in de eerste week.

Resultaat

De meeste mensen zijn tevreden na een flapoorcorrectie. Toch is 100% symmetrie niet te garanderen. Kraakbeen kan soms deels terugveren in de oude vorm. Heel soms is een tweede operatie nodig. Achter het oor komt een litteken, maar dit valt meestal weinig op.

Risico's van de operatie

Een flapoorcorrectie is een veilige ingreep. Zoals bij elke operatie zijn er risico's. De wond kan gaan bloeden of ontsteken. Dit komt zelden voor. Neem contact op met de KNO-arts als:

- Het verband loslaat.
- U of uw kind een nabloeding krijgt.
- De pijn langer dan 2 dagen aanhoudt.
- Er sprake is van koorts.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Flapoorcorrecties worden vaak niet vergoed. Wilt u weten of de operatie voor u of uw kind vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Een flapoorcorrectie zorgt vaak voor een duidelijk mooier resultaat. Maar houd er rekening mee dat de oren nooit helemaal symmetrisch worden. Dat is ook bij natuurlijke oren niet het geval. Wilt u meer weten over het aanwezig zijn bij het inleiden van narcose bij kinderen? Vraag dan naar de aparte folder hierover. Heeft u vragen? Schrijf ze op en bespreek ze tijdens het spreekuur met de KNO-arts.