Longperfusiescan

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's
Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.


Inleiding

Wat is een longperfusiescan



Deze scan helpt ons te zien hoe het bloed door uw longen stroomt.

Hoe gaat het onderzoek?



1. **Ontvangst en wachtkamer**: In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie**: Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Liggend op het bed krijgt u een injectie met een speciale stof.
3. **Onderzoek**: Blijf stil liggen tijdens de scan. Haal diep adem zodat de stof zich verspreidt.
4. **De scan**: De scan duurt ongeveer 10 minuten. U voelt hier niets van. Soms duurt het onderzoek langer voor extra foto's.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



- **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- **Eten en drinken**: U mag normaal eten en drinken. Drink wel twee extra glazen water na de injectie.
- **Medicijnen**: U kunt uw normale medicijnen blijven innemen.

Wat neemt u mee?



- Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Longperfusiescan

Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U wordt opgehaald uit de wachtkamer en neemt plaats op de onderzoekstafel.
De medewerker zal u vragen uw arm te ontbloten.
Daarna wordt er een stuwband om uw bovenarm aangebracht.
Deze band voelt strak aan.
Een deel van uw arm wordt schoongemaakt met een vochtig gaasje.
Hierna volgt de prik om de vloeistof in te spuiten.

De prik doet evenzeer.
De medewerker zal u vragen om een aantal keren diep te zuchten.
Vervolgens worden er meerdere foto's van uw longen gemaakt.
U voelt hier niets van.
Gewoonlijk duurt het onderzoek 15 minuten.

Na het onderzoek



Na het onderzoek

- U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.



De uitslag van het onderzoek

- De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.

Belangrijk om te weten



- **Borstvoeding**: Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.
- **Straling**: De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.